

Е. В. Смыкалова

МАТЕМАТИКА

ЗАДАЧИ ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ









4

Е. В. Смыкалова

Математика
Задачи
по теории вероятностей

4 класс

Демоверсия

Санкт-Петербург
СМИ МетаШкола
2023

УДК 373.51
ББК 20.я72

Смыкалова Елена Владимировна

С52 Математика. Задачи по теории вероятностей. 4 класс: Сборник задач / Е. В. Смыкалова. – СПб.: СМИ МетаШкола, 2023. – 72 с. – ISBN 978-5-6051167-0-7

Сборник содержит 120 задач по теории вероятностей для 4 класса: задачи на случайные события; задачи на статистическое и классическое определение вероятности. Рассматриваются различные способы решения задач. Приводятся образцы оформления для первых четырёх задач каждой главы. Ко всем задачам есть ответы и подробные решения в конце книги. Книга будет интересна и полезна ученикам 4 класса, их родителям и учителям математики.

ISBN 978-5-6051167-0-7

© Смыкалова Е. В., 2023
© СМИ МетаШкола, 2023

Все права защищены.
Эта книга, целиком или частично, не может быть использована или размещена где-либо в любой форме и с использованием любых технических средств без письменного разрешения владельца авторских прав. Нарушение прав преследуется по закону.

www.metaschool.ru

Оглавление

Предисловие.....5

1. Случайные события.....6

2. Статистическое определение вероятности.....16

3. Классическое определение вероятности.....23

4. Задачи повышенной сложности.....32

Решения и ответы.....40

Предисловие

Сборник содержит 120 задач по теории вероятностей для 4 класса. В первой главе — задачи на случайные события; во второй главе — задачи на статистическое определение вероятности; в третьей — задачи на классическое определение вероятности; в четвёртой — задачи повышенной сложности.

Рассматриваются различные способы решения задач. Приводятся образцы оформления для первых четырёх задач каждой главы. Ко всем задачам есть ответы и подробные решения в конце книги. Книга будет интересна и полезна ученикам 4 класса, их родителям и учителям математики.

Это первая книга серии «Задачи по теории вероятностей» для 4–9 классов.
Материал книги был апробирован на уроках математики, на занятиях математического кружка
в Физико-математическом лицее № 366 Санкт-Петербурга и в интернет-кружке МетаШколы www.metaschool.ru.

Желаем успехов в изучении математики!

1. Случайные события

Кубик игральный в теории вероятностей имеет шесть граней правильной формы. На каждой грани выбито точками число, и при бросании кубика выпадает одно из шести чисел: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сумма чисел на противоположных гранях равна 7.



Случайные события — это события, которые при одних и тех же условиях могут произойти, а могут и не произойти. Например: выпадение пятёрки при бросании кубика.
Невозможные события — в данных условиях произойти не могут. Например: выпадение семёрки при бросании кубика.

Достоверные события — в данных условиях произойдут обязательно. Например: выпадение числа меньше семи при бросании кубика.
Одни случайные события более вероятные — ближе к достоверным, а другие менее вероятные — ближе к невозможным.

1. Бросают кубик. Какое из событий достоверное:
1) выпадение числа не больше, чем 5;
2) выпадение чётного числа;
3) выпадение числа меньше, чем 7;
4) выпадение числа больше, чем 4?

Решение.

На гранях кубика: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1) Не является достоверным, может выпасть 6.
2) Не является достоверным, может выпасть нечётное число.
3) Достоверное событие, числа 1, 2, 3, 4, 5, 6 меньше, чем 7.
4) Не является достоверным, может выпасть 1, 2, 3 или 4.
Ответ: 3.

-
-
-

24. В коробке лежат шарики: 4 белых, 5 красных и 3 чёрных. Наугад вынимается один шарик. Какое событие наиболее вероятно:
1) вынутый шарик не белый;
2) вынутый шарик красный;
3) вынутый шарик не чёрный;
4) вынутый шарик белый?

2. Статистическое определение вероятности

Монета в теории вероятностей имеет только две стороны, одна из которых «орёл», другая — «решка». Монету бросают, и она падает одной из сторон вверх.



Чтобы выяснить, насколько вероятно то или иное случайное событие, связанное с экспериментом, нужно подсчитать, как часто оно происходит. При этом рассматривают две величины:

- *абсолютная частота* показывает, сколько раз в серии экспериментов наблюдалось данное событие;
- *относительная частота* показывает, какая доля экспериментов завершилась наступлением данного события.

Относительная частота определяется делением

абсолютной частоты на число экспериментов: n/N.
Например: при бросании монеты «орёл» выпал 11 раз из 20; абсолютная частота равна 11, а относительная частота равна 11/20.
Статистическое определение вероятности: за вероятность случайного события принимается его относительная частота, полученная в серии экспериментов: P=n/N.

- Для невозможного события n=0, относительная частота равна 0, вероятность события равна 0, это событие не произойдет.
- Для достоверного события n=N, относительная частота равна 1, событие обязательно произойдет.
- Для случайного события 0≤n≤N, относительная частота от 0 до 1 включительно, вероятность события от 0 до 1 включительно.

25. Проведён эксперимент по бросанию монеты. «Орёл» выпал 49 раз, а «решка» — 52 раза. Найдите относительную частоту выпадения «орла» в данном эксперименте.

Решение.

Монету подбрасывали 49 + 52 = 101 раз.
Относительная частота выпадения «орла»: 49/101.
Ответ: 49/101.

-
-
-


48. Стрелок 45 раз попал в мишень и 8 раз — не попал. Найдите относительную частоту попаданий в мишень.

3. Классическое определение вероятности

Монета в теории вероятностей имеет только две стороны. Выпадение «орла», выпадение «решки» — равновероятные события. Никакой другой вариант невозможен, монета не может потеряться или встать на ребро.

Кубик игральный в теории вероятностей имеет шесть граней правильной формы. Выпадение каждого из чисел (1, 2, 3, 4, 5, 6) — равновероятные события. Никакой другой вариант невозможен, кубик не может потеряться или встать на ребро.

Домино. В классическом наборе 28 прямоугольных фишек, которые разделены на две части. На каждой части точками отмечены числа от 0 до 6 включительно.




Рассмотрим случайный эксперимент, который может

завершиться одним из n возможных исходов, причём все исходы *равновероятны*, нет никаких оснований считать один исход вероятнее другого.
Например:
1) при бросании монеты число возможных исходов n = 2, может выпасть «орёл» или «решка»;
2) при бросании кубика число возможных исходов n = 6, может выпасть 1, 2, 3, 4, 5 или 6.
Пусть ровно m из этих n исходов приводят к наступлению некоторого события A, такие исходы называются *благоприятными*.
Классическое определение вероятности: $P(A) = m/n$.
Вероятность случайного события A — это отношение m/n, где n — число всех возможных исходов эксперимента, m — число исходов, благоприятных для события A.
Например:
1) пусть благоприятным исходом будет выпадение «орла» при бросании монеты, m = 1; n = 2; вероятность выпадения «орла» при бросании монеты равна 1/2;
2) пусть благоприятным исходом будет выпадение тройки при бросании кубика, m = 1; n = 6; вероятность выпадения тройки при бросании игрального кубика равна 1/6.
Классическое определение вероятности можно использовать только в случае с равновероятными исходами!
Противоположные события — пара событий A и B таких,

что если происходит событие A, то событие B не происходит и наоборот. Из двух противоположных событий одно обязательно произойдёт, а одновременно они произойти не могут.
Сумма вероятностей противоположных событий равна единице: P(A) + P(B) = 1.
Вероятность противоположного события: P(B) = 1 – P(A).
Примеры противоположных событий:
1) выпадение «орла», выпадение «решки» при бросании монеты;
2) выпадение нечётного числа, выпадение чётного числа при бросании кубика.

49. Монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что «орёл» выпадет один или два раза.

Решение.



Возможные варианты: ОО; ОР; РО; РР.

Вероятность того, что «орёл» выпадет один или два раза: 3/4.
Ответ: 3/4.

-
-
-

84. В лотерее 7 выигрышных билетов и 143 билета без выигрыша. Какова вероятность выиграть в эту лотерею, купив один билет?

4. Задачи повышенной сложности

Объединением двух или нескольких событий называется событие, состоящее в наступлении хотя бы одного из них в результате испытания.
Например: в ящике один красный шар и один белый шар;
событие A — извлечён красный шар;
событие B — извлечён белый шар;
событие $(A \cup B)$ — извлечён красный или белый шар.
Для несовместных событий $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
Общая формула: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

85. Случайным образом выбирается трёхзначное число. Найдите вероятность того, что первая цифра этого числа — 5, а последняя цифра — 6.

Решение.

По правилу произведения:
1) всего трёхзначных чисел: $9 \cdot 10 \cdot 10 = 900$;
2) трёхзначных чисел, первая цифра которых 5,
а последняя 6: $1 \cdot 10 \cdot 1 = 10$.
Вероятность того, что первая цифра этого числа — 5,
а последняя цифра — 6: $10/900 = 1/90$.
Ответ: 1/90.

-
-
-

120. В автомобильном номере три цифры. Все комбинации цифр считаются равновероятными. Найдите вероятность того, что в выбранном номере две последние цифры — нули.

Решения и ответы

5. 3.
На гранях кубика: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Событие 3 (выпадение семёрки) — невозможное событие.

6. 4.
На гранях кубика: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Событие 4 (выпадение восьмёрки) — невозможное событие.


7. 3.
На гранях кубика: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Событие 3 (выпадение числа меньше семи) — достоверное событие.

8. 4.
На гранях кубика: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Событие 4 (выпадение числа не больше шести) — достоверное событие.

-
-
-

120. 10/1000 = 1/100.
Всего вариантов:
первая цифра — любая из десяти (0, 1, 2, …, 9);
вторая цифра — любая из десяти (0, 1, 2, …, 9);
третья цифра — любая из десяти (0, 1, 2, …, 9).
По правилу произведения: $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$.
Все 1000 комбинаций цифр считаются равновероятными.
В выбранном номере:
первая цифра — любая из десяти (0, 1, 2, …, 9);
вторая цифра — 0, один вариант;
третья цифра — 0, один вариант.
По правилу произведения: $10 \cdot 1 \cdot 1 = 10$.
Вероятность того, что в выбранном номере две последние цифры — нули: 10/1000 = 1/100.

МетаШкола



ISBN 978-5-6051167-0-7